

みなみかぜ



南台病院 広報誌
平成29年 2月 Vol.8

ジェネリック医薬品

〔ジェネリック医薬品とは〕

新薬の特許が切れたあとに販売される、新薬と同じ有効成分、効き目、安全性をもつ安価なお薬のことです。後発医薬品(後発品)とも呼ばれています。



「ジェネリック」の意味は？

「一般的な」「総称の」という意味を持つ英語です。欧米では、一般名で処方することが多いため、「ジェネリック医薬品」と呼ばれています。



詳しくは薬剤科までお気軽にご相談ください。

南台病院 薬剤科

☎042-341-7111 内線204


〔ジェネリック医薬品が安いのは〕

新薬を研究・開発するのは多くの費用がかかります。発売後も有効性と安全性を確認するため、費用がかかります。ジェネリック医薬品は新薬で有効性・安全性の確認された成分を用いて製造するため、少ない研究開発費で製造することができます。そのため、お薬の価格(薬価)が安くなります。これは、みなさんの医療費負担を軽減します。




〔ジェネリック医薬品に変更できないことがあります〕


☆ 特許や承認などにより、新薬にだけ認められている効能・効果があります。



☆ ジェネリック医薬品のない新薬があります。



☆ お薬の種類によっては変更できないことがあります。



「無料なんでも医療相談」のご案内

日時：第5週を除く水曜日、午後3時～3時30分

場所：南台病院 外来診察室

※事前の予約は不要ですので、受付窓口又は外来看護師まで、お気軽に声をお掛け下さい。

実施日	担当	実施日	担当
2月 1日(水)	看護部	2月 15日(水)	勝見副院長
2月 8日(水)	リハビリテーション科	2月 22日(水)	健康管理室

※過去の相談内容：健診の結果について・LDH、CRP、白血球等の検査項目について
貧血改善に向けた食事相談について

採尿で気を付けること教えて。

[Q]採尿する時に気を付けることは

[A] 尿は中間尿を採ってください

おしっこをする時、出始めの尿は捨てて途中の尿を採尿カップに採ります。

生理中の方は採尿前に看護師に申し出ましょう。

[Q]尿量はどのくらい必要？



[A]尿量が少ない場合は検査技師に相談しましょう

[Q]おしっこが出ない場合はどうしたらいいの？

[A]まずはトイレに行く前に尿検査がないか確認しましょう。尿検査がある場合は先に採尿をすませましょう。尿が出ない場合はお水を飲んで様子を見ます。1時間程度で尿意を催す方が多いようです。

どうしても当日、採尿が出来ない場合は自宅で採尿して検査することも可能です。容器をお渡ししますので看護師にご相談ください。

放射線科でよく質問されること。

[Q] 何度も X 線撮影を行っていますが大丈夫でしょうか？

[A] X 線を受けた部位によって身体への影響は異なり、ある線量(しきい線量:mGy)を越えることにより身体的症状が出てくる可能性があります。

通常の撮影で受ける X 線の量はこのしきい線量よりはるかに少ない (~10mGy) ので身体的症状が現れてくることはありません。

例) 胸部撮影の線量 0.07mGy

脊髄への影響として造血機能の低下があり、そのしきい線量 500mGy

当院では毎週土曜日の午前・午後とも外来診療を行っております。ご利用下さい。

診療受付時間 (月曜日～土曜日) 午前：8時30分～11時30分 午後：1時～4時

社会福祉法人黎明会 南台病院 〒187-0032 東京都小平市小川町1-485

電話番号：042-341-7111 (代) ホームページ：<http://minamidaihp.jp/>